



Ministero della Salute

SORVEGLIANZA PARALISI FLACCIDA ACUTA (PFA)

Casi di PFA segnalati in Italia nel periodo 2013-2017 (per regione di residenza)

REGIONE	2013		2014		2015		2016		2017	
	S	A	S	A	S	A	S	A	S	A
Piemonte	4	6	8	6	3	6	7	6	7	6
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lombardia	18	14	13	14	5	14	15	14	13	14
Bolzano	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Trento	1	1	-	1	1	1	5	1	0	2
Friuli-Venezia-Giulia	1	1	1	1	0	1	0	1	2	2
Veneto	5	7	1	7	4	7	10	7	5	7
Liguria	0	2	1	2	0	2	1	2	0	2
Emilia-Romagna	3	6	6	6	4	6	2	6	0	6
Toscana	3	5	5	5	1	5	2	5	0	5
Marche	0	2	0	2	1	2	0	2	0	2
Umbria	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
Abruzzo	0	2	1	2	2	1	2	2	1	2
Molise	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Lazio	4	8	4	8	3	8	4	8	1	8
Campania	10	9	9	9	7	9	0	9	2	9
Puglia	11	6	6	6	5	6	9	6	5	6
Calabria	0	3	1	3	1	3	0	3	1	3
Basilicata	1	1	-	1	0	1	0	1	1	1
Sicilia	3	7	5	7	5	7	9	7	8	7
Sardegna	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
Totale ITALIA	66	83	63	84	44	84	68	83	49	82

casi per 100.000 soggetti di età 0-14 anni : S= segnalati - A= attesi

Indicatori di performance del Sistema di Sorveglianza PFA in Italia anni 2013 -2017

INDICATORE	2013	2014	2015	2016	2017
Tasso di PFA non polio < 15 anni	0,79	0,75	0,52	0,82	0,60
% casi PFA con 2 campioni di feci entro 15 gg	65%	76%	68%	53%	61%
% casi PFA con almeno 1 campione entro 14 gg	77%	85%	75%	60%	69%
% casi PFA con <= 7 gg tra insorgenza sintomi e notifica	82%	84%	72%	91%	59%
% casi PFA con follow-up	95%	99%	91%	93%	71%
Indice di sorveglianza	0,52	0,57	0,36	0,54	0,38