

| N. | Livello di assistenza                   | Definizione   | Peso | Classi di punteggi di valutazione   |                      |   |                               |                      |                           |
|----|---|---|------|---|----------------------|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
|    |   |   |      | Valore normale 9  | Scostamento minimo 6 | Scostamento rilevante ma in miglioramento 3   | Scostamento non accettabile 0 | Validità del dato -1 |                           |
| 1  | Prevenzione                             | 1.1 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib).   | 1    | tutte >=95%   |                      |   |                               |                      |                           |
|    |   | 1.2 Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)  | 0,3  |   |                      | 90,48%  |                               |                      |                           |
|    |   | 1.3 Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale nell'anziano (>= 65 anni)   | 0,2  |   | 61,00%               |   |                               |                      |                           |
| 2  | Prevenzione                             | Proporzione di persone che ha effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cervice uterina, mammella, colon retto  | 1    | score=9   |                      |   |                               |                      |                           |
| 3  | Prevenzione                             | 3.2 Indicatore composto sugli stili di vita   | 0,6  | DATI PASSI<br>valore osservato 2017 (IC95%): dati mancanti<br>valore atteso 2012 (IC95%): 41,9 (29,7-54,1)<br><br>DATI ISTAT<br>valore osservato 2017 (IC95%): 45,2 (42,3-48,1)<br>valore atteso 2012 (IC95%): 49,8 (43,4-56,3) |                      |   |                               |                      | Per il quinto anno (2017) |
| 4  | Prevenzione salute nei luoghi di lavoro | Percentuale di unità locali controllate sul totale da controllare   | 0,4  | 5,06%   |                      |   |                               |                      |                           |
| 5  | Prevenzione                             | 5.1 MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - Efficacia dei controlli ufficiali per il contrasto alla TUBERCOLOSI bovina - (percentuale di allevamenti controllati per TBC bovina e trend della prevalenza; le regioni con status sanitario non omogeneo per territorio, vengono valutate con i criteri previsti per le non ufficialmente indenni)  | 0,4  | 100% prev 0,0% e in decremento del 10% (2016=0,1%)  |                      |   |                               |                      |                           |
|    |   | 5.2 MALATTIE ANIMALI TRASMISSIBILI ALL'UOMO - Efficacia dei controlli ufficiali per il contrasto alla BRUCELLOSI ovcaprina, bovina e bufalina. OM 28 maggio 2015 - (percentuale di allevamenti controllati, trend della prevalenza e alimentazione dei sistemi informativi. Nota 1: le regioni con status sanitario non omogeneo, per specie o territorio, vengono valutate con i criteri previsti per le non ufficialmente indenni - Nota 2: se risultano inseriti in SANAN <80% dei controlli sierologici, si assegna il punteggio di valutazione immediatamente inferiore) | 0,4  | 100% e prevalenza BOV 0,2% in diminuzione   |                      |   |                               |                      |                           |
|    |   | 5.3 ANAGRAFI ANIMALI - Controlli delle popolazioni animali per la prevenzione della salute animale ed umana: percentuale di aziende ovcaprine controllate per anagrafe ovcaprina rispetto al 3% previsto dal Regolamento CE 1505/06   | 0,1  | 100% - % aziende sottoposte a controllo risultanti da check list 3,32   |                      |   |                               |                      |                           |
| 6  | Prevenzione                             | 6.1 CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - attuazione del Piano Nazionale per la ricerca di Residui (PNR) di farmaci, sostanze illecite e contaminanti negli alimenti di origine animale: percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati  | 0,3  | oltre 100%  |                      |   |                               |                      |                           |
|    |   | 6.2 CONTROLLI SANITARI SVOLTI NELLE FASI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI: con l'Accordo Stato Regioni del 10 novembre 2016 è stata approvata una linea guida sui controlli ufficiali che modifica la base normativa di riferimento dell'indicatore 6.2 della Griglia LEA.  | 0    | Indicatore sospeso per l'anno 2017 e in rielaborazione, alla luce dell'Accordo CSR 10 novembre 2016, per la Griglia LEA 2018  |                      |   |                               |                      |                           |
|    |   | 6.3 CONTAMINANTI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE - programma di ricerca di residui di fitosanitari degli alimenti vegetali (tabelle 1 e 2 del DM 23/12/1992); percentuale dei campioni previsti i cui estiti sono resi disponibili per l'invio all'EFSA nei tempi previsti   | 0,3  | Maggiore o uguale al 100% in frutta, ortaggi, cereali e olio. 90% nel vino  |                      |   |                               |                      |                           |
| 7  | Distrettuale                            | 7.1 Tasso ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per: asma e gastroenterite  | 0,59 |   |                      |   | 288,6                         |                      |                           |
|    |   | 7.2 Tasso ospedalizzazione standardizzato (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, BPCO e scompenso cardiaco  | 0,59 |   |                      |   | 451,77                        |                      |                           |
| 8  | Distrettuale domiciliare anziani        | Percentuale di anziani >= 65 anni trattati in ADI   | 2,35 | 5,36%   |                      |   |                               |                      |                           |
| 9  | Distrettuale residenziale anziani       | 9.1 Numero di posti equivalenti per assistenza agli anziani >= 65 anni in strutture residenziali per 1.000 anziani residenti  | 1,17 |   |                      | 0,78  |                               |                      |                           |
|    |   | 9.2 Numero di posti per assistenza agli anziani >= 65 anni in strutture residenziali per 1.000 anziani residenti  | 0,29 |   |                      | 0,81  |                               |                      |                           |
| 10 | Distrettuale disabili                   | 10.1.1 Numero di posti equivalenti residenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti  | 0,59 |   | 0,43                 |   |                               |                      |                           |
|    |   | 10.1.2 Numero di posti equivalenti semiresidenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti  | 0,35 |   |                      | 0,05  |                               |                      |                           |
|    |   | 10.2.1 Numero di posti in strutture residenziali che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti  | 0,12 | 0,72  |                      |   |                               |                      |                           |
|    |   | 10.2.2 Numero di posti in strutture semiresidenziali che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti  | 0,12 |   |                      | 0,23  |                               |                      |                           |
| 11 | Distrettuale malati terminali           | Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100)  | 1,47 | 1,87  |                      |   |                               |                      |                           |
| 12 | Distrettuale farmaceutica               | Percentuale del consumo annuo (espresso in DDD - Dosi Definite Die) dei farmaci appartenenti al PHI   | 0,50 |   | 74,40%               |   |                               |                      |                           |
| 13 | Distrettuale specialistica              | Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti  | 0,59 | 5,75  |                      |   |                               |                      |                           |
| 14 | Distrettuale salute mentale             | Numero assistiti presso i Dipartimenti di salute mentale per 1.000 residenti  | 1,17 | 18,32   |                      |   |                               |                      |                           |
| 15 | Ospedaliera                             | 15.1 Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato per 1.000 residenti  | 1,5  | 142,83  |                      |   |                               |                      |                           |
|    |   | 15.2 Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico per 1.000 residenti   | 1    |   | 10,86                |   |                               |                      |                           |
|    |   | 15.3 Tasso di accessi di tipo medico (standardizzato per età) per 1.000 residenti   | 0,5  | 78,4  |                      |   |                               |                      |                           |
| 17 | Ospedaliera                             | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario   | 2,5  | 0,18  |                      |   |                               |                      |                           |
| 18 | Ospedaliera                             | 18.1.1 Percentuale parti cesarei primari in maternità di II livello o comunque con >=1000 parti   | 1    |   |                      | Non presenti strutture con più di 1.000 parti |                               |                      |                           |
|    |   | 18.1.2 Percentuale parti cesarei primari in maternità di I livello o comunque con <1000 parti   | 0,50 |   |                      | 30,50%  |                               |                      |                           |
|    |   | 18.2 Percentuale di parti fortemente pre-termine avvenuti in punti nascita senza U.TIN  | 0,61 | 16,7%   |                      |   |                               |                      |                           |
| 19 | Ospedaliera                             | Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario  | 1,5  |   |                      | 23,47%  |                               |                      |                           |
| 21 | Emergenza                               | Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (minuti)  | 1    | 21  |                      |   |                               |                      |                           |

## Valutazione

## Intervallo

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Adempiente</b>   | ≥ 160 o compreso tra 140 - 160 e nessun indicatore critico (con classe di punteggio di valutazione <3)      |
| <b>Inadempiente</b> | < 140 o compreso tra 140 - 160 con almeno un indicatore critico (con classe di punteggio di valutazione <3) |